

Aanbevelingen voor het behouden van metazachloor bevattende herbiciden

BASF Agricultural Solutions Belgium

Het herbicide **metazachloor** wordt gebruikt in voor-opkomst en na-opkomst ter bestrijding van onkruiden (veel grassen en breedbladigen) in **koolzaad** en in een **ganse reeks groenten**. Het toepassen van de goede landbouwpraktijken bij de landbouwers is essentieel om deze oplossing te kunnen behouden.



Richtlijnen aanbevolen door BASF in België:

- 1) Ter bescherming van het grondwater: zelfs als de toelatingen het gebruik melden van maximaal 1 kg/ha metazachloor (over 3 jaar), raadt BASF aan om maximaal **750 g metazachloor/ha** toepassen in de herfst of het voorjaar verspreid over 3 jaar.
- 2) Ter bescherming van het oppervlaktewater moet bij het behandelen van gedraineerde percelen volgende punten in acht worden genomen :

Wanneer?	Dosis metazachloor
15/03 tot 30/09	Maximale dosis van 750 g/ha
01/10 tot 15/10	Maximale dosis van 500 g/ha
15/10 tot 15/03	GEEN toepassingen meer

- 3) Het toepassen van de goede landbouwpraktijken door de landbouwers aanmoedigen, en vooral **“puntvervuilingen” voorkomen**.

Voor meer informatie: www.topps-life.org

- 4) Bij het behandelen van koolzaadpercelen met aangrenzende waterlopen moeten de bufferzones, zoals aangegeven op het etiket, gerespecteerd worden.

Ontwikkeling van BASF producten die metazachloor bevatten: naar een vermindering van de actieve stof per ha



Butisan® Plus: 400g/l metazachloor+
100 g/l quinmerac
Bufferzone van 10 m met minimum
90% driftreducerende techniek

Butisan® Gold: 200 g/l metazachloor +
200 g/l dimethenamide-P + 100 g/l
quinmerac
Bufferzone van 20 m met klassieke
techniek

Recommandations pour sécuriser l'utilisation d'herbicides à base de métazachlore

BASF Agricultural Solutions Belgium

Le **métazachlore** est une molécule dont l'efficacité est indispensable à la plupart des situations de **déssherbage du colza et des légumes**. Il est essentiel de respecter les bonnes pratiques d'utilisation pour pouvoir conserver cette solution.



Mesures conseillées par BASF en Belgique:

- 1) Pour la protection des eaux souterraines: même si les agréations autorisent l'utilisation de 1 kg/ha de métazachlore (sur 3 ans), BASF recommande d'appliquer max. **750 g/ha** de métazachlore à l'automne ou au printemps, et répartis **sur 3 ans**
- 2) Pour la protection des eaux de surface, tenir compte des points suivants lors du traitement de parcelles drainées:

Quand?	Dose métazachlore
15/03 au 30/09	Dose max. de 750 g/ha
01/10 au 15/10	Dose max. de 500 g/ha
15/10 au 15/03	Plus AUCUNE application

- 3) Promouvoir le respect des bonnes pratiques agricoles auprès des agriculteurs, et surtout éviter les **pollutions « sources ponctuelles »**
Pour plus d'informations, consulter le site: www.topps-life.org
- 4) Lors du traitement de cultures bordant des cours d'eau, des canaux/ruisseaux, une **zone tampon doit être respectée** pour les champs de colza bordés d'eaux de surface

Evolution des produits BASF contenant du métazachlore: vers une **diminution** de la matière active/ha



Butisan® Plus: 400 g/l métazachlore +
100 g/l quinmerac
Zone tampon de 10 m avec
technique réduisant la dérive de
minimum 90%

Butisan® Gold: 200 g/l métazachlore +
200 g/l dimethenamide-P + 100 g/l
quinmerac
Zone tampon de 20 m avec technique
classique

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ons advies voor bentazon

Gebruik Basagran® SG en Corum® + Dash® verstandig.

Gebruik de interactieve kaart op onze website www.agro.bASF.be

Volg zorgvuldig de gebruiksaanbevelingen.



We create chemistry

Gedeponeerd handelsmerk BASF. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Notre conseil pour la bentazone

Utilisez Basagran® SG et Corum® + Dash® intelligemment.

Utilisez la carte interactive de notre site www.agro.bASF.be

Suivez attentivement les recommandations d'utilisation.



We create chemistry

Marque déposée BASF. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.